

Kort vejledning Behandling ved mistænkt anafylaktisk reaktion under anæstesi

Nedenstående er generelle behandlingsforslag, baseret på udenlandske retningslinier. Behandling skal altid tilpasses den aktuelle kliniske situation.

Voksne

Primær behandling

- Afbryd tilførsel af mistænkt antigen, kald hjælp
- Frie luftveje, ventilation med 100% ilt
- Trendelenburgs leje
- **ADRENALIN** - ved hypotension 0,01-0,05 mg bolus iv - *gentages til effekt opnås*
 - ved kredsløbskollaps 0,1-1,0 mg bolus iv - *gentages til effekt opnås*
 - hvis ingen iv adgang, 0,5-0,8 mg im
- Krystalloid 2-4 liter, evt. kolloid,
Evt. infusion af adrenalin 0,05-0,1 mikrogram/kg/min eller noradrenalin 0,05-0,1 mikrogram/kg/min

Sekundær behandling

- Antihistamin: - H₁-blokker f.eks. clemastin (*Tavegyl*) 2 mg iv
 - og evt. H₂-blokker, f.eks. ranitidin 50 mg iv
- Steroid: - Methylprednisolon (*SoluMedrol*) 80 mg iv
 - eller Hydrocortison (*SoluCortef*) 250 mg iv
- Inhalerede bronkodilatator f.eks. terbutalin (*Bricanyl*)

Børn

- **Adrenalin** - ved hypotension 0,001-0,005 mg/kg iv - *gentages til effekt opnås*
 - ved kredsløbskollaps 0,01 mg/kg iv - *gentages til effekt opnås*
 - hvis ingen iv adgang 0,005-0,01 mg/kg im
- Isotonisk NaCl 20 ml/kg, evt mere
- Clemastin (*Tavegyl*) 0,025 mg/kg iv evt im
- Methylprednisolon (*SoluMedrol*) 2mg/kg iv / Hydrocortison (*SoluCortef*) 50-100 mg iv

Fremgangsmåde ved henvisning til DAAC

1. Der tages blodprøve til analyse af serum tryptase. (Brug udstyr i [anafylaksipakken](#))

- Tages ½ - 4 timer efter reaktion (kan evt. tages senere ved alvorlige reaktioner)
- 10 ml blod i tørglas (oftest rød/brun top)
- Label med patientnavn, cpr.nr. , dato og tidspunkt påklæbes
- Blodprøverekvisition udfyldes (husk tidspunkt for prøve) og vedlægges
- Blodprøven sendes i plastikrør ved stuetemperatur med almindelig post til:

*Laboratoriet for Medicinsk Allergologi
Gentofte Hospital, opgang 2 kælderens
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup*

2. Henvisning til Dansk Anæstesi Allergi Center

Henvisningsblanketten downloades på www.daac.dk udfyldes og sendes til:

*Dansk Anæstesi Allergi Center
Gentofte Hospital, Allergiklinikken KAA-816
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup*