

Behandling af mistænkt anafylaksi under anæstesi

Nedenstående er generelle behandlingsforslag, baseret på danske og udenlandske retningslinjer. Behandling skal altid tilpasses den aktuelle kliniske situation.

Voksne

Primær behandling

- Afbryd tilførsel af mistænkt allergen, kald hjælp
- Frie luftveje, ventilation med 100% ilt
- Trendelenburgs leje
- **ADRENALIN**
 - ved hypotension 0,01-0,05 mg iv - gentages til effekt
 - ved kredsløbskollaps 0,1-1,0 mg iv - gentages til effekt
 - hvis ingen iv adgang 0,3-0,5 mg im
 - evt. infusion af adrenalin 0,05-0,1 µg/kg/min eller noradrenalin 0,05-0,1 µg/kg/min
- Væskebehandling hurtigt indløb af krystalloid 500-1000 ml, yderligere 1-3 liter til effekt

Sekundær behandling

- Antihistamin f.eks. clemastin (Tavegyl) 2 mg iv
- Steroid Methylprednisolon (SoluMedrol) 80 mg iv eller Hydrocortison (SoluCortef) 250 mg iv
- Inhaleret beta.2.agonist f.eks. terbutalin (Bricanyl) eller salbutamol (Ventoline)

Børn

• Adrenalin

- ved hypotension 0,001mg/kg iv - gentages til effekt
- ved kredsløbskollaps 0,01 mg/kg iv - gentages til effekt
- hvis ingen iv adgang 0,15 mg im (< 25 kg) eller 0,3 mg im (> 25 kg)
- Væskebehandling krystalloid 20 ml/kg over 10 min - kan gentages x 3 i første time
- Clemastin (Tavegyl) 0,025 mg/kg iv evt. im
- Methylprednisolon (SoluMedrol) 2mg/kg iv / Hydrocortison (SoluCortef) 50-100 mg iv

Fremgangsmåde ved henvisning til DAAC

1. Der tages blodprøve til analyse af tryptase. (Brug udstyr i [anafylaksipakken](#))

- Tages ½ - 3 timer efter reaktion (kan evt. tages senere ved alvorlige reaktioner)
- 10 ml blod i tørglas (oftest rød/brun top)
- Label med patientnavn, cpr.nr. , dato og tidspunkt påklæbes
- Blodprøverekvisition (findes på www.daac.dk) udfyldes og vedlægges
- Blodprøven sendes i plastikrør ved stuetemperatur med almindelig post til:

*Laboratoriet for Medicinsk Allergologi
Gentofte Hospital, opgang 22 kælderens
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup*

2. Henvisning til Dansk Anæstesi Allergi Center

- Henvisningsblanketten (findes på www.daac.dk) udfyldes og sendes til:

*Dansk Anæstesi Allergi Center
Gentofte Hospital, Klinik for allergi UA-816GE
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup*

Tlf. 3867 2497