

Behandling af mistænkt perioperativ anafylaksi

Nedenstående er generelle behandlingsforslag, baseret på danske og udenlandske retningslinjer. Behandling skal altid tilpasses den aktuelle kliniske situation.

Voksne

Primær behandling

- Afbryd tilførsel af mistænkt allergen, kald hjælp
- Frie luftveje, ventilation med 100% ilt
- Trendelenburgs leje
- Væskebehandling hurtigt indløb af krystalloid 500-1000 ml, kan gentages til effekt
- **ADRENALIN**
 - ved hypotension 0,01-0,02 mg iv – gentages til effekt eller øges til 0,05 mg iv
 - ved svær hypotension 0,05 mg iv - gentages til effekt eller øges til 0,1-0,2 mg iv
 - hvis ingen iv adgang 0,3-0,5 mg im
 - evt. infusion af adrenalin 0,05-0,1 µg/kg/min eller noradrenalin 0,05-0,5 µg/kg/min

Sekundær behandling

- Antihistamin f.eks. clemastin (Tavegyl) 2 mg iv
- Steroid Methylprednisolon (SoluMedrol) 80 mg iv
- Inhaleret beta.2.agonist f.eks. terbutalin (Bricanyl) eller salbutamol (Ventoline)

Børn

• Adrenalin

- ved hypotension 0,001mg/kg iv - gentages til effekt
- ved kredsløbskollaps 0,01 mg/kg iv - gentages til effekt
- hvis ingen iv adgang 0,15 mg im (< 25 kg) eller 0,3 mg im (> 25 kg)
- Væskebehandling krystalloid 10 ml/kg over 10 min - kan gentages til effekt
- Clemastin (Tavegyl) 0,025 mg/kg iv evt. im
- Methylprednisolon (SoluMedrol) 2mg/kg iv

Fremgangsmåde ved henvisning til DAAC

1. Der tages blodprøve til analyse af tryptase. (Brug udstyr i anafylaksipakken på daac.dk)

- Tages ½ - 2 timer efter reaktion (kan evt. tages senere ved alvorlige reaktioner)
- 5-10 ml blod i gelglas påsat label med navn/CPR og prøvetidspunkt
- Blodprøverekvisition (findes på daac.dk) udfyldes og vedlægges
- Blodprøven sendes i plastikrør ved stuetemperatur med almindelig post til:

Laboratoriet for Medicinsk Allergologi
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 22, kælderens
2900 Hellerup

2. Henvisning til Dansk Anæstesi Allergi Center

- Henvisningsblanketten (findes på daac.dk) udfyldes og sendes til:

Dansk Anæstesi Allergi Center
Gentofte Hospital, Allergisygdomme, klinik 1
Gentofte Hospitalsvej 8, 1. sal
2900 Hellerup

Tlf. 3867 2497 overlæge Birgitte Bech Melchior/ Professor, overlæge Lene Heise Garvey